

GLI EFFETTI DELLE DROGHE

TIPO DI DROGA	QUANTO TEMPO DOPO	EFFETTI
Cannabis (canapa indiana)	1 ora dopo l'assunzione	sopravvalutazione delle proprie capacità sottovalutazione di situazioni di pericolo alterazione della coordinazione motoria, della percezione del tempo e dell'attenzione percezione più acuta dei contorni, dei colori e della profondità allucinazioni, (es. frenare all'improvviso di fronte ad un ostacolo inesistente).
Anfetamine	$\frac{1}{2}$ ora dopo l'assunzione	senso di euforia e di eccitazione accelerazione del battito cardiaco sottovalutazione delle situazioni di pericolo (viaggiare a forte velocità in centro abitato), difficoltà di concentrazione incapacità di valutazione delle distanze e della velocità (sorpassi azzardati) colpo di sonno.
Cocaina	5 minuti dopo l'assunzione	sensazione di aumento delle capacità intellettive euforia sottovalutazione delle conseguenze dei comportamenti, manovre rischiose (sorpassi azzardati, attraversamento di un incrocio con semaforo rosso).
Cocaina	Dopo 2 ore (durata soggettiva) (fase down)	Sonnolenza - incapacità di concentrazione -Alterazione dei riflessi - Stanchezza - depressione
Ecstasy	Dopo $\frac{1}{2}$ ora	euforia ed eccitazione mancanza del senso di fatica Sottovalutazione delle situazioni di pericolo (non fermarsi allo stop) effetti allucinatori disturbi nella percezione Modificazione del senso di valutazione delle distanze e della velocità (sorpassi azzardati), la visibilità laterale (visione a tunnel) Aumento della sensibilità all'abbagliamento nella guida notturna (incidenti agli incroci, di sera e nelle gallerie) Rallentamento dei tempi di reazione.
Eroina	Dopo 10 secondi	sonnolenza riduzione della capacità di concentrazione alterazione della coordinazione motoria

		riduzione del livello di attenzione rallentamento dei riflessi che inducono a sottovalutare situazioni di pericolo (non fermarsi al passaggio dei pedoni)
LSD	Dopo 1 minuto	alternanza di momenti di euforia e depressione allucinazioni ed alterata percezione della realtà sottovalutazione delle situazioni di pericolo visione di ostacoli inesistenti. riduzione della capacità di valutare le distanze e la velocità (sorpassi azzardati) e i tempi di reazione stati di allucinasi transitoria
Mephedrone (ditto anche: Meow Meow, Meph, Drone, Meow, Bubbles, 4-MMC e MCAT)	Dopo 15/45 minuti	aumento dei livelli di energia euforia desiderio di socializzare agitazione sensazione di distacco, visione sfocata, midriasi bruxismo aumento della frequenza cardiaca e degli impulsi sessuali eccessiva sudorazione con odore di pesce mal di testa palpitazioni nausea dita fredde e bluastre paranoia, allucinazioni attacchi di panico incoscienza convulsioni collasso coma morte per blocco respiratorio
Cobret o Kobret	Dopo 15/20 minuti	Euforia Sedazione Sonnolenza Miosi Depressione respiratoria Nausea e vomito Morte per collasso o arresto cardio-circolatorio
GHB (ecstasy liquida)	Dopo 15/45 minuti	Sensazione di piacere diffuso Rilassamento e tranquillità Sensualità Euforia e tendenza a verbalizzare Disinibizione Aumento della sensibilità tattile Nausea

		Vertigini Sonnolenza Disturbi della vista Respiro affannoso Amnesia Incoscienza
--	--	--